

QUESTION DE NATURE

Les oiseaux nicheurs

Sédentaires et grands migrateurs

Essentiels à la biodiversité locale, les oiseaux nicheurs font partie intégrante du paysage de la région. Près de 190 espèces peuvent être observées sur l'ensemble du territoire. Voici quelques espèces parmi celles que vous aurez (peut-être) la chance d'apercevoir près de chez vous !

Le chardonneret élégant

Carduelis carduelis

Le chardonneret élégant est présent sur l'ensemble du territoire de Bourgogne. Étant un oiseau commun, les observations sont faciles et fréquentes dans des milieux divers (urbain, rural, bocages, milieux agricoles ouverts). Des menaces liées à l'activité agricole pèsent sur l'espèce : l'intensification des cultures, la disparition des haies ou encore l'utilisation de pesticides.



Photo Georges Bedrines

La chouette effraie

Tyto alba



Photo Ludovic Jouve

La chouette effraie est une espèce étroitement liée à l'habitat humain, il est assez fréquent d'en apercevoir dans son jardin ou son grenier. Elle apprécie les petits villages ruraux entourés de prairies et cultures, lieux où elle trouve sa nourriture. Bien qu'elle soit lente, la diminution des populations est constante depuis des années. Plusieurs causes ont été identifiées : la fluctuation des ressources alimentaires, la circulation routière ou l'aménagement et l'isolation des combles. Il s'agit d'une espèce inscrite sur la liste rouge mondiale des espèces menacées, elle fait l'objet d'un travail d'étude mené par l'association bourguignonne La Chouette est protégée sur l'ensemble du territoire français.

PARTENARIAT

Page réalisée en partenariat avec BFC Nature, association fédératrice regroupant 25 structures en Bourgogne Franche-Comté ayant trait à la biodiversité. Une coopération nécessaire afin de mieux "transmettre pour préserver".



POUR EN SAVOIR PLUS

■ Glossaire

Prairies paratourbeuses : prairie dont les propriétés se rapprochent de la tourbe, en présentant notamment un niveau d'eau proche de la surface du sol, le rendant alors spongieux.

Peupleraie : plantation de peupliers.

Espèce opportuniste : espèce peu spécialisée qui est capable de s'adapter à des conditions de vie variées.

Corbeautière : colonie établie dans des grands arbres (peuplier, platane) pouvant regrouper plusieurs centaines de nids.

■ En savoir plus

Retrouvez un descriptif complet de ces espèces et bien plus encore dans le hors-série n° 15 *Atlas des oiseaux nicheurs de Bourgogne* (2017). Informations supplémentaires également disponibles sur les sites bourgogne-franche-comte-nature.fr, shna-ofab.fr ou lachoue.fr.



Photo Didier Sevestre

La cigogne noire

Ciconia nigra

Présente dans les 4 départements de l'ex-région Bourgogne, la cigogne noire est une migratrice transsaharienne. Elle passe l'hiver en Afrique avant de revenir en France pour la période de reproduction (février-mars). Très rare et vulnérable, ses menaces principales sont d'origine humaine avec notamment des dérangements en période de reproduction et l'électrocution des individus (pylônes).

La bécassine des marais

Gallinago gallinago

On retrouve la bécassine des marais dans les prairies paratourbeuses du Morvan, sur des sites Natura 2000. Son statut de conservation est précaire et l'espèce est classée en "danger critique" de disparition sur la liste rouge des oiseaux nicheurs menacés en Bourgogne. Pourtant, elle fait partie des espèces encore chassées.



Photo Robert Masson



Photo Ludovic Jouve

Le milan royal

Milvus milvus

Le milan royal est irrégulièrement réparti sur le territoire. **Opportuniste**, ce migrateur partiel dépend des ressources trophiques locales. Face aux menaces qui planent sur l'espèce (dégradation de son habitat, empoisonnements, tirs, collisions, dérangements humains, éoliennes) des mesures sont mises en place, notamment par des associations de protection de la nature : maintien des paysages agricoles traditionnels, construction de placettes d'alimentation, sensibilisation.

Le corbeau freux

Corvus frugilegus

Le corbeau freux est très présent en Côte-d'Or : on y retrouve de nombreuses corbeautières situées principalement dans les peupleraies. C'est une espèce considérée comme "susceptible d'occasionner des dégâts" puisqu'elle cause des dégâts sur les cultures, notamment en hiver. Pour cette raison, sa destruction réglementée est donc autorisée.



Photo Georges Bedrines